


EXERCICI 2 (2,5 punts)


a) [1 punt]

<i>Dibuix</i>	
<i>Tipus d'aqüífer i argumentació</i>	El de Celrà ha de ser de tipus lliure ja que es troba en materials quaternaris superficials i permeables (sorres i graves). Els aqüífers lliures estan en contacte directa amb la zona subsaturada del sòl, no estan confinats per cap capa impermeable

b) [0,5 punts]

<i>Nivell piezomètric</i>	És el nivell per sobre del nivell del mar al qual l'aigua d'un aqüífer es troba a pressió atmosfèrica, en aqüífers lliures coincideix amb el nivell freàtic.
<i>Població on es trobarà aigua primer</i>	A Flacà trobarem aigua més ràpidament, haurem de perforar 9 metres (40m-31m).
<i>Profunditat</i>	Haurem de perforar 9 metres (40m – 31m)

d) [1 punt]



Correlació temporal entre els dos paràmetres

La correlació s'explica com a conseqüència de la recàrrega de l'aqüífer per infiltració de la precipitació, a l'agost però és quan hi major extracció d'aigua de l'aqüífer a través de pous (o major evapotranspiració o bé pluges torrencials on es perd molta aigua per escolament superficial que va al riu sense infiltrar-se)